

УДК 595.767(575.2)

**Х. Дадабаев****ДВА НОВЫХ ВИДА РОДА PROSODES  
(COLEOPTERA, TENEBRIONIDAE) ИЗ ТАДЖИКИСТАНА**

Типы описываемых видов хранятся в коллекции кафедры зоологии Таджикского государственного университета (Душанбе).

*Prosodes (Megaprosodes) tshikatunovi* Dadabaev, sp. n.

Голотип ♂, южный склон Гиссарского хр., Рамит, ущ. Холмон 17.04.1982, Дадабаев; паратипы 13 ♂, 5 ♀, там же, 14.05.1982, 21.06.1982, Дадабаев.

С а м е ц. Матово-черный. Передний край наличника по всей ширине дуговидно выемчатый. Виски за глазами сходятся к шейному сужению округло. Глаза расположены несколько косо вперед и вниз. Боковые края щек перед глазами параллельносторонние, слегка сужающиеся книзу и переходящие в загнутый вперед зубец. Боковые края головы между глазом и основным краем наличника выступают почти под прямым углом с закругленной вершиной, и чуть сужаясь к основанию наличника, образуют с ним небольшой тупой угол. Поверхность головы в густой мелкой пунктировке, разреженной к центру лба и наличника. Посреди темени имеется небольшая округлая площадочка, почти полностью лишенная пунктировки. Поверхность верхней губы покрыта наклонно торчащими вперед бурыми волосками. Виски в мелкой зернистости. Весь низ головы в темных, коротких прилегающих волосках.

Усики относительно короткие, основания переднеспинки не достигают. Длина 2-го членика чуть меньше его ширины, 3-й в 2,4 раза длиннее ширины, в 3,3 раза длиннее 2-го и в 1,8 раза — 4-го. С 4-го по 7-й членики равные по длине, удлинённые (ширина в 1,2 раза меньше длины) и слегка расширенные к вершине. Ширина 7-го членика чуть больше ширины 4—6-го члеников. 2—7-й членики покрыты жесткими прилегающими и полуприлегающими волосками. 8—10-й членики примерно одинаковой длины, в 1,25 меньше ширины, к вершине постепенно суживаются, 11-й членик удлинённый, в 1,5 раза длиннее ширины, резко сужается к вершине и образует острый угол.

Переднеспинка поперечная (ширина больше длины в 1,07 раза), в 1,5 раза шире головы, с наибольшей шириной в передней части, без волосков. Передний край слегка выемчатый. Основание переднеспинки слегка волнистое с чуть заступающими назад углами. Бока выступают легким изгибом в передней самой широкой половине, а в основной половине почти прямо сходятся к основанию, с основанием переднеспинки образуют острый угол. Передний угол тупой, слегка закругленный. Окаймление неясное в средней части, более отчетливо проступает ближе к углам и на углах.

Поверхность переднеспинки в центральной части более или менее равномерно покрыта мелкой негустой пунктировкой (расстояние между точками равно или больше поперечника точек), по бокам и на углах основания во вмятинах пунктировка грубая, густая, почти сливающаяся. У переднего края переднеспинки выпуклая по всей ширине с продольно расположенным, неглубоким вдавливанием. В средней части по бокам выражены продольные вдавливания, внутренними краями переходящие в выпуклость переднеспинки. В месте перехода вмятин в выпуклость

находятся продольные участки, лишенные пунктировки. Проплевры в более или менее густой пунктировке, точки иногда сливающиеся. Переднегрудка блестящая, негусто покрыта тонкими, светлыми волосками.

Надкрылья удлиненные, в 2,15 раза длиннее ширины с наибольшей шириной посередине, где они в 1,14 раза шире переднеспинки в продольных, чередующихся между собой широких и тонких бороздах. Тонкие борозды от швов к боковым краям еще более утончаются. Наружный




Рис. 1. *Prosodes tshikatunovi* sp. n. (а) и *P. rectilineata* (б).




Рис. 2. Контуры *Prosodes dolini* sp. n. (а) и *P. grandicollis* (б).

край проплевр сверху виден у основания и вершин надкрылий. Боковой край надкрылий тупой. Вершины надкрылий слегка оттянуты. Ложные эпиплевры относительно узкие, в основной половине параллельносторонние, в средней части равномерно сужаются к вершине. Весь низ тела в густой, почти сливающейся пунктировке, которая иногда чередуется с мелкими складочками, и покрыт мелкими, светлыми, едва заметными прилегающими волосками.

Ноги типично ходильные, передние голени узкие, их внутренний край тупой, наружная сторона в вершинной половине несколько уплощена. Бедра передних ног в вершинной части значительно, средних и задних ног — менее расширены к вершине. Вершины голени и членков лапок, а также края подошвы членков лапок покрыты гребнем коротких, плотных, бурых волосков. Внутренняя шпора передних голеней заметно короче наружной. Длина тела 21—23,5 мм, 8 мм.

С а м к а. Тело более широкое. Ширина переднеспинки больше длины в 1,1 раза, ширина переднеспинки больше ширины головы в 1,5 раза. Пунктировка переднеспинки менее отчетливая. Сама переднеспинка лишена волосков. Надкрылья менее удлиненные (длина превышает ширину в 1,5 раза). Кроме основания вся поверхность надкрыльев лишена волосков, и только вдоль шва встречаются единичные, мелкие светлые волоски. Вся поверхность в продольных широких бороздах, и в отличие от самцов более тонкие борозды в ширину почти равны широким. Надкрылья в 1,38 раза шире переднеспинки. Внутренняя поверхность голени покрыта толстыми, короткими бурыми волосками. Длина тела 24 мм, ширина 10,7 мм.

Вид назван в честь энтомолога В. И. Чикатунова.

Обитает в лесной зоне на высоте 1500 м. От других видов подрода *Megaprosodes* Reitter отличается более укороченным и выпуклым телом. Наиболее близок к *P. rectilineata* A. Vog., от которого отличается более широкими продольными гребнями и менее оттянутыми концами надкрылий.

*Prosodes (Prosodestes) dolini* D a d a b a e v, sp. n.

Голотип ♂, Таджикская ССР, хр. Ходжа-Мастон, 6.05.1982, Дадабаев; паратип ♀, там же.

**С а м е ц.** Передний край наличника слегка дуговидно выемчатый с чуть выдающимися вперед углами. Виски сразу за глазами прямо сходятся к шейному сужению. Глаза расположены нижним концом кпереди. Щеки перед глазами параллельносторонние с резко загнутыми вперед нижними концами. Боковой край головы, не выступая перед глазами, прямой линией сходится к основанию наличника и далее, не образуя угла, к его вершине. Поверхность головы в мелкой, едва заметной, редкой пунктировке и покрыта такими же мелкими, едва заметными, редкими волосками. Наличник более блестящий, чем лоб. Поверхность верхней губы покрыта длинными, жесткими, наклонно торчащими, бурыми волосками. Виски в мелких, темных волосках, гуще расположенных, чем на голове. Весь низ головы в светлых прилегающих волосках и мелкой зернистости.

Усики относительно длинные, достигают основания переднеспинки. Длина 2-го членика чуть меньше ширины, 3-й в 4,5 раза длиннее своей ширины, в 5,4 раза длиннее 2-го и в 2,45 раза 4-го; 4—6-й членики удлинённые, чуть расширенные у вершинной части и равные между собой по длине и ширине, их ширина меньше длины в 1,8 раза. 7-й членик сильно расширен к вершине, в 1,1 раза длиннее предыдущего, его ширина у вершины в 1,6 раза меньше длины; 8—9-й членики круглые, одинаковой длины и ширины; 8-й членик длиннее 9-го в 1,1 раза. 10-й членик равен по длине 9-му, но в ширину меньше него в 1,1 раза. 11-й членик, равный по ширине 10-му, удлинённый, с резко сужающимися сторонами к вершине и пересекающиеся там под острым углом. 2—7-й членики покрыты темными, жесткими, полуприлегающими или наклонно торчащими, длинными волосками. 8—11-й членики по периметру наибольшей ширины покрыты такими же, но расположенными в один ряд, под большим углом единичными волосками.

Переднеспинка продольная в 1,08 раза длиннее ширины, в 1,53 шире головы, с наибольшей шириной впереди середины. Основание переднеспинки прямое, неокаймленное, задние углы почти не выступают назад. Бока округло выступающие, в основной половине с небольшим изгибом сходятся кзади. Окаймление бокового края нерезкое. Передний край прямой. Переднеспинка выпуклая, вся поверхность густо усеяна мелкими, четкими вмятинами с мелкими, темными волосками по середине. По бокам выпуклости вмятины расположены настолько густо, что сливаясь, образуют складки. К вершине вмятины разреживаются, посередине образуют прямую линию, тянущуюся продольно от основания почти до переднего края переднеспинки. У основания переднеспинки, по всей ее ширине, расположены 5 небольших вдавлений по 2 по краям и 1 посередине (2 самых крайних расположены под окаймлением боковых краев чуть выше задних углов, 3 внутренних — прямо у основания выпуклости переднеспинки). Проплевры в мелких, редких точках. Стернит переднегрудки блестящий, в мелких, редких, светлых волосках.

Надкрылья длиннее ширины в 1,7 раза, с наибольшей шириной посередине, где они в 1,3 раза шире переднеспинки. Наружный край проплевр сверху виден по всей длине, вершины надкрылий оттянуты назад. Боковой край надкрылий тупой. Поверхность надкрылий гладкая с продольным углублением вдоль шва, в густых, мелких, загнутых назад, буроватых волосках. Ложные эпиплевры довольно широкие и от средней части неравномерно сужающиеся к вершине. Низ в редкой, мелкой, почти сглаженной пунктировке и едва заметных мелких, светлых волосках.

Ноги типично ходильные, голени тонкие, округлые в поперечнике. Бедрa передних ног резко расширены к вершине, средних и задних —

лишь незначительно. Внутренняя шпора передних голеней значительно меньше наружной. Бедра в тонких прилегающих, голени и лапки в более толстых, бурых полуприлегающих волосках. Края подошвы лапок, вершины голеней и члеников лапок покрыты гребнем бурых щетинок. Длина тела 15 мм, ширина 6,1 мм.

**Самка.** Тело более широкое. Переднеспинка длиннее ширины в 1,08 раза и шире головы в 1,6 раза, от переднеспинки самца отличается отсутствием выраженной продольной линии посередине. Надкрылья в 1,2 раза шире, переднеспинка в 1,5 раза длиннее своей ширины. Поверхность покрыта неотчетливыми, мелкими и более крупными бесформенными вмятинами и неровностями с некоторой продольной направленностью. Боковой край надкрылий имеет острый угол, боковой край проплевр ближе к вершинной части не просматривается. Голени более широкие. Полиморфизм почти не выражен. Длина тела 16,1 мм, ширина 7,3 мм. Обитает в поясе аридного редколесья низкогорного хр. Ходжа-Мастон на высоте 700—800 м.

Наиболее близок к *P. grandicollis* из подрода *Prosodestes* Rtt 1909, от которого отличается более удлиненным телом, продольной переднеспинкой, отсутствием широких продольных гребней на элитрах, а также покрова из волосков на элитрах и переднеспинке.

**Two New Species of the Genus Prosodes (Coleoptera, Tenebrionidae) from Tadzhikistan.** Dadabaev Kh.— *Vestn. zool.*, 1986, No. 4.— *Prosodes (Megaprosodes) tshikatunovi* sp. n. is described from Southern slope of Ghissar mountain range, Risht, Dolon; *Prosodes (Prosodestes) dolini* sp. n.—from Khodja-Maston mountain range. Types are deposited in the collections of Tadjik State University (Dushanbe).

Таджикский государственный университет  
им. В. И. Ленина

Получено 03.10.85

УДК 595.768.1 (470.6)

А. С. Константинов

## НОВЫЙ ВИД РОДА LONGITARSUS (COLEOPTERA, CHRYSOMELIDAE) С СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КAVKAZA

Во время экспедиции в районы северо-западного Кавказа, наряду с другими видами листоедов-блошек, был обнаружен новый вид из рода *Longitarsus* Latr., описание которого приводится ниже.

Голотип описываемого вида передается на хранение в коллекцию Зоологического института АН СССР (Ленинград), паратипы — в коллекцию Института зоологии им. И. И. Шмальгаузена АН УССР (Киев). Автор глубоко благодарен И. К. Лопатину за помощь в выполнении работы.

### *Longitarsus abchasicus* Konstantinov sp. n.

**Материал.** Голотип ♂, Абхазская АССР, Сухумский р-н, окр. с. Псху, 2100 м, 20.06.1984; паратипы 6♂, там же, 20.06.1984, 5♂, окр. оз. Рица, ур. Ауадхара, 1600 м, 19.06.1984.

Верх коричнево-желтый, голова, переднеспинка и низ тела более темные. Надкрылья с темно-коричневой шовной каемкой, суженной у щитка, наиболее широкой около середины и заканчивающейся перед вершинами надкрылий. Ее контуры около середины нечеткие. Усики с затемненными 5—11-м члениками. Верхняя губа и наличник черные. Ноги желтые, задние бедра заметно темнее, но не черные, как у близких видов.

Лоб слабо выпуклый, мелко шагреневанный, без точек. Лобные бугорки трапециевидные, надбугорковые бороздки слабые. Лобный киль